

Optimiser l'utilisation des concentrés pour gagner plus dans l'engraissement des agneaux

D'après les experts, en Suisse, la consommation de viande d'agneau a de l'avenir notamment auprès de la jeune génération et de la société multiculturelle. Des engraisseurs d'agneaux professionnels et motivés, regroupés au sein de nouvelles organisations de commercialisations et de nouveaux labels de production, et des grands distributeurs performants entendent renforcer l'offre indigène et lui trouver de nouveaux débouchés. Pour produire des agneaux de qualité bien en viande permettant de réaliser de bons gains à la boucherie, il faudrait intensifier l'affouragement durant la période d'allaitement et surtout après le sevrage.

Essai sur le terrain

Les chefs d'exploitation gardent 120 brebis mères des races Suffolk et BNB, ainsi que des brebis croisées. Durant la période de végétation, une partie des agneaux sevrés disposent du libre accès à la stabulation et au pré. La prairie naturelle est exploitée en pâture tournante et les agneaux peuvent se réfugier dans l'étable en cas de forte pluie ou lorsque le soleil est trop brûlant. On sait que la consommation d'herbe est plus importante quand les agneaux peuvent la brouter courte. Au printemps, lorsque la végétation croît fortement, il est donc indiqué de mettre en place un système de fauche. À la crèche, les agneaux reçoivent journalièrement environ 200 g de STRUCTURA et 400 g d'aliment pour agneaux à l'engrais floconné. Ils ont libre accès à un aliment minéral sous forme de bacs à lécher, au sel pour le bétail et à l'eau fraîche.

Performances d'engraissement et consommation de concentré durant l'essai sur le terrain

Sexe	Nbre d'agneaux	Poids initial kg	Poids final kg	Jours d'engraissement	Gains journaliers g	Concentré* kg/agneau	Coûts concentré fr./agneau	Coûts concentré fr./kg de croît
f	26	32.2	42.0	32.6	300	19.5	12.87	1.31
m	31	33.0	42.9	32.1	308	19.2	12.67	1.28

* Ø 0,2 kg 2365 STRUCTURA et 0,4 kg 2910 Aliment pour agneaux à l'engrais

Taxation CH-TAX et gain

Graisse ->	1	2	3	4	5	Gain fr./agneau
C			30 %	10 %		Ø Fr. 250.-
H			34 %	23 %		
T			3 %			

Gain supplémentaire / Coût supplémentaire concentré* / Solde bénéficiaire

Amélioration qualité/agneau**	Coûts concentrés / agneau	Solde / agneau
Charnure / couverture: fr. -.90 × 20 kg PM = Fr. 18.-	Fr. 12.76	Fr. 6.24 ou fr. 355.65 par groupe

*sans fourrage de base + gain de travail

** chef d'exploitation

Résultats d'engraissement prometteurs

Interprétation des résultats d'engraissement et conclusions :

- En cas de complémentation au pré, le gain journalier double par rapport à l'alpage ou à l'affouragement en vert sans concentrés. Sans complémentation, le chef d'exploitation déclare atteindre au mieux la classe T+ et rarement la classe H.
- L'alimentation intensive et l'amélioration de la saturation de la panse / ingestion de fourrage peut augmenter le potentiel de charnure des agneaux à l'engrais, si bien qu'il est possible de gagner une à deux classes de charnure dans CH-TAX.
- Avec un prix moyen de 5 fr. 90/kg PV au départ de l'étable via le marchand, les engraisseurs d'agneaux ont réalisé un gain d'abattage de 250 fr., soit environ 15 fr. de gain supplémentaire par agneau. S'y ajoutent les économies réalisées grâce à la baisse du travail permise par le raccourcissement de la période d'engraissement.
- Le pourcentage d'agneaux C4 et H4 a pu être encore réduit grâce à l'adaptation des mesures d'affouragement durant le pré-engraissement et la période d'allaitement.
- Une complémentation en concentré modérée durant la mise à l'herbe améliore le résultat d'exploitation et vaut la peine dans tous les cas.

Nous souhaitons aux engraisseurs d'agneaux plein succès en matière d'affouragement.

Peter Bringold
CP ovins / caprins
Meliofeed SA